Samtente *Melanitta fusca*

Samtente *Anas fusca*, Sammet-Ente
Kupferstich von Johann Friedrich NAUMANN, aus: J. F. NAUMANN,
Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 12. Theil, Leipzig 1844

Frühere Artnamen:
Sammtente *Oedemia fusca, L.* (Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861)
Samtente *Oidemia fusca (L.)* (Löns, H., 1907)
Samtente *Oidemia f. fusca (L).* (Brinkmann, M., 1933)
Samtente *Oidemia f. fusca (L.)* (Tantow, F., 1936)
Regionale Artnamen:
Kougeke (Borkum). (Brinkmann, M., 1933)

Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861:
Selten im Winter.

Löns, H., 1907:
Seltener Wintergast.

Brinkmann, M., 1933:
Wintergast.
Nach Leege ist die Samtente auf den Inseln ziemlich häufiger Wintergast. ...
Die Fälle des Vorkommens im Binnenlande sind gezählt.

Tantow, F., 1936:
Seltenere Durchzügler.
Die Samtente, Oidemia f. fusca (L.), berührt unser Gebiet ebenfalls, zwar in wenig Stücken, aber jedes Jahr. Am 24. November 1929 waren nach mdl. Mitteilung von Döhling mehrere auf der Alster in Hamburg, und Verfasser sah auf einer Barkassenfahrt am 15. April 1934 auf dem Schweinesand drei Erpel.