

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*



Sichelstrandläufer *Tringa ferruginea* Der rothbraune Strandläufer
Kupferstich von J. M. HERGENROEDER und J. C. BOCK aus: Johann WOLF und
Berhard MEYER, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, Nürnberg 1805

Frühere Artnamen:

Bogenschnäbliger Strandläufer *Calidris ferruginea* (Brünn). (Brinkmann, M., 1933)

Bogenschnäbliger Strandläufer *Calidris ferruginea* (Brünn.) (Tantow, F., 1936)

Sichelstrandläufer (Kiefer, H., 1953)

Brinkmann, M., 1933:

Durchzugsvogel.

An der Küste wird dieser Strandläufer häufiger als im Binnenlande beobachtet. ...

R. Blasius (1896) nannte ihn Durchzügler ...

Tantow, F., 1936:

Von Mitte August ab beobachtet man dort (bei Fährmannssand, Verf.) auch mal einen Bogenschnäbligen Strandläufer, *Calidris ferruginea* (Brünn.), und von dann an bis Mitte Oktober und wieder Anfang April unter Alpenstrandläufern den etwas häufigeren Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (Leisl.).

Kiefer, H., 1953:

Drei Sichelstrandläufer zeigten sich an gleicher Stelle (Alte Elbe vor Radegast, Verf.) am 6. und 9. September 1952 zusammen mit 9 Sandregenpfeifern.