Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rG 1.001-5.000 Ind.	Datensätze: 175/19 Datenlage: mittel	Status Nds: I Bestand Nds: 2 R RL Nds: 1	Status D: $I^B I^W$ Bestand D: es^B 8 P ss^W RL D: $1^B 1^W$

Der Rastbestand erreichte seinen Höhepunkt auf dem Frühjahrszug zur Monatswende Februar/März und auf dem Herbstzug im Oktober. Größere Ansammlungen waren meist artrein, während einzeln oder in kleinen Gruppen beobachtete Individuen häufig unterzählig mit Kiebitzen vergesellschaftet waren.



Abb. 1: Goldregenpfeifer. Links: Monatssummen der Beobachtungen. Rechts: Monatssummen der beobachteten Individuen im Landkreis Lüneburg 2008-2016

Rastbestände (Ansammlungen > 200 Ind.):

09.11.2009	950 Ind.	S Brahlstorf (K.-W. KIRSCH, U.RICK)
24.11.2009	1.700 Ind.	S Brahlstorf (K.-W. KIRSCH, U.RICK)
27.02.2010	240 Ind.	S Sumte (D. & M. BOROWSKI)

Besonders frühe Erstfeststellungen:

13.01.2008	14 Ind.	NW Wilkenstorfer Teiche und 1 Ind. S Pinnau (F. ALLMER, C. HORN, B. MIELKE)
16.01.2011	1 Ind.	SW Tripkau (F. ALLMER, C. HORN, B. MIELKE)
20.01.2014	15 Ind.	W Klein Banratz (J. WÜBBENHORST)

Sehr späte Frühjahrsfeststellung:

03.05.2008	3 Ind.	NE Neu Wendischthun (K.-W. Kirsch, U.RICK)

Sehr frühe Wegzügler:

15.07.2013	1 Ind., Prachtkleid	Sudeniederung (K.-W. KIRSCH, U.RICK)
15.07.2015	1 Ind.	Radegaster Haken (J. WÜBBENHORST)

HR

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

rG 1.001-5.000	Datensätze 176 / 25 Datenlage gut	RL: Nds 1 ; D 1

Heimzug:
Ab Anfang Februar (05.02.2007: 1 Ind., Niendorf, Felder im Norden B195; U. RICK, K.-W. KIRSCH) bis Ende April (30.04.2007: 18 Ind., Niendorf, Felder nördl. B195, feuchte Senke im Acker; U. RICK, K.-W. KIRSCH).
Hauptdurchzugzeit im Februar/März (82 von 96 Frühjahrsmeldungen), mit deutlich höheren Individuenzahlen als während des Wegzuges.

Wegzug:
Ab Mitte Juli (14.07.2003: 5 Ind., Elbvorland Stiepelse, elbabwärts ziehend; U. RICK, K.-W. KIRSCH), 14.07.2004: 2 Ind., Vierwerder, im Kiebitzschwarm; K. FLIEGEL) bis Mitte Dezember (15.12.2003: 48 Ind., Elbvorland Brackede-Vierwerder; G. BARDOWICKS; 15.12.2003: 33 Ind., Elbevorland Barförde/Sassendorf; G. BARDOWICKS; 15.12.2003: 35 Ind., Preten, Feuchtwiesen, Felder im NE; U. RICK, K.-W. KIRSCH).
Hauptdurchzugzeit ist der September mit 27 von 80 Beobachtungen.





Abb. 86: Goldregenpfeifer. Links: Jahresmaxima aus allen vorliegenden Daten (1996/97 bis 2006/2007); Trend nicht signifikant, Abnahme. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) aus allen vorliegenden Daten (n=282).

Es liegt eine Beobachtung aus dem Januar vor:
10.01.2005: 55 Ind., Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)

Größere Ansammlungen ab 1.000 Ind.:

11.03.2001	1.800 Ind.	Grünland NW Wilkenstorfer Teiche (F. ALLMER)
18.09.2001	2.000 Ind.	Sückau, Felder im N (U. RICK, K.-W. KIRSCH)
23.02.2002	1.200 Ind.	Stapel-Privelack (M. SCHWAB, S. HÜFNER)
17.03.2003	2.500 Ind.	Felder im SW Niendorf (U. RICK, K.-W. KIRSCH)

Regelmäßig vergesellschaftet mit Staren- und Kiebitzschwärmen.

CH