Gelbspötter *Hippolais icterina*

Gelbspötter *Motacilla Hippolais* Die Bastardnachtigal
Kupferstich von Johannes MÜLLER, aus: Die vorzüglichsten Sing-Vögel Teutschlands, Nürnberg 1800

Frühere Artnamen:
Bastard-Nachtigall, Spottvogel. *Sylvia hypolais, L.* (Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861)
Gartensänger *Hypolais vulgaris Br.* (Krohn, H., 1904)
Gartensänger *Hypolais philomela (L.)* (Löns, H., 1907)
Gartensänger *Hippolais hippolais (L.)* (Krohn, H., 1910)
Gartenspötter *Hypolais hypolais, Linné.* (Varges, H., 1913)
Gartenspötter *Hippolais icterina (Vieill).* (Brinkmann, M., 1933)
Gartenspötter (Tantow, F., 1936)
Regionale Artnamen :
Gäelbosje (Bremen), **Hofsingerke** (Ostfriesland) **Spraklihrer** (Lafferde). (Brinkmann, M., 1933)

Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861:
Brutvogel. Ziemlich häufig.

Krohn, H., 1904 :
Von P. Müller-Kämpff in allen Gärten der Ortschaften Soltau, Tatlingen und Wilsede bemerkt.

Löns, H., 1907:
Verbreiteter Garten- und Parkbrüter.

Krohn, H., 1910:
Unterseits schwefelgelb.
Zeigte sich bei Stöckte, Borstel und häufiger bei Brackede und Sassendorf.

Varges, H., 1913:
Vorstehende drei Arten (Gartengrasmücke, Zaungrasmücke, Gartenspötter, Verf.) öfter gehört und gesehen, aber nie eingehender beobachtet.

Drenckhan, H., 1926:
Anfang Mai kommt einer unserer besten Sänger, der Gartensänger, dessen Gesang zwar etwas hart, aber sehr melodienreich ist und unablässig vorgetragen wird. Man achte auf seinen Lockton, der „diterüid“ lautet und sofort bei seiner Ankunft ertönt. Wir treffen ihn in den Anlagen. Er bleibt nicht lange, schon im August verläßt er uns wieder.

Brinkmann, M., 1933:
Regelmäßiger Brutvogel.
In der Heide ... bewohnt er gern die kleinen Holzungen der Wallgräben in der Nähe der Dörfer.

Tantow, F., 1936:
Brutvögel des niederen und höheren Buschwerks.
Gartenspötter. ...
Folgende Singvögel sind häufigere und regelmäßige Brutvögel (in den Obst- und Gartenbaugebieten, Verf.): ... Gartenspötter ...
Den Gartenspötter findet man in den Gärten, auch Bauerngärten, gar nicht selten; er ist als verstreuter Brutvogel im ganzen Gebiet zu finden.