# Weißwangengans *Branta leucopsis*

**(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Status:<br>rG 1.001-5.000 Ind. | Datensätze:<br>2.311/257<br>Datenlage: gut | Status Nds: I<br>Bestand Nds: 45 P<br>RL Nds: * | Status D: $I^B I^W$<br>Bestand D: $ss^B$ 410-470 BP $h^W$<br>RL D: $*^B *^W$ |

Weißwangengänse sind im Landkreis Lüneburg regelmäßige Gastvögel von Oktober bis April. Die Rastbestände sind im März besonders hoch und konzentrieren sich in der Elbtalaue mit dem Amt Neuhaus sowie der Echemer und Scharnebecker Marsch. Nahrungshabitate sind vorwiegend Grünland, Wintergetreide und Stoppeläcker. Vergesellschaftungen dieser Rastbestände mit Bläss- und Saatgänsen sind die Regel. Dabei können Truppgrößen von mehreren hundert Individuen beobachtet werden.

Im Zeitraum von Mai bis Mitte September wurden nur übersommernde Einzelvögel gemeldet. Ab Mitte September treffen bereits einige wenige Individuen (Wintergäste bzw. Durchzügler) bei uns ein.

*Ankunft im Winterquartier - erste Feststellungen:*

| | | |
|---|---|---|
| 06.10.2008 | 1 Ind. | Habekost, Garlstorf (G. Bardowicks) |
| 05.10.2009 | 2 Ind. | Brackeder Stau, Bleckede (J. Wübbenhorst) |
| 29.09.2010 | 3 Ind. | Heisterbuschwiesen, Bleckede (J. Wübbenhorst) |
| 29.09.2011 | 1 Ind. | Heisterbuschwiesen, Bleckede (H. Müller-Scherz) |
| 30.09.2012 | 2 Ind. | Pommau E, Amt Neuhaus (W. Habicht) |
| 23.09.2013 | 8 Ind. | Neu Bleckede, Bleckede (I. Fahne) |
| 03.10.2014 | 9 Ind. | Habekost, Garlstorf (F. Allmer, C. Horn) |
| 30.09.2015 | 2 Ind. | Rassau-Kaarßen, Amt Neuhaus (W. Habicht) |
| 16.09.2016 | 6 Ind. | Wilkenstorfer Teiche, Amt Neuhaus (H. Rahlfs) |

Foto 1: 27.03.2012, Weißwangengänse, Bleckede, Habekost, Heinz Georg Düllberg




Abb. 1: Weißwangengans. Links: Summe der Beobachtungen (n=2.311) und der beobachteten Individuen (n=148.485). Rechts: durchschnittliche Monatssummen der Beobachtungen (n=257) und der Individuen (n=16.498) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Der starke Anstieg der beobachteten Individuen ist hauptsächlich auf zunehmende Beobachtungs- und Meldeaktivitäten zurückzuführen und erlaubt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Bestandsentwicklung der Art.

*Wegzug aus dem Winterquartier - letzte Feststellungen:*

| | | |
|---|---|---|
| 14.04.2009 | 6 Ind. | Vierwerder, Gastorf, Bleckede (H. MÜLLER-SCHERZ) |
| 06.04.2010 | 86 Ind. | Reineckenort, Bleckede (G. HORN) |
| 18.04.2011 | 1 Ind. | Alte Elbe, Bleckede (G. HORN) |
| 23.04.2012 | 1 Ind. | Barförde-Sassendorf (G. BARDOWICKS) |
| 15.04.2013 | 359 Ind. | Stiepelse, Amt Neuhaus (U. RICK, K.-W. KIRSCH) |
| 16.04.2014 | 1 Ind. | Alte Elbe, Bleckede (H. G. DÜLLBERG) |
| 20.04.2015 | 1 Ind. | Stiepelse, Amt Neuhaus, Bleckede (U. RICK, K.-W. KIRSCH) |
| 01.04.2016 | 7 Ind. | Hafen Bleckede, Bleckede (I. SALOMON) |

*Größere Ansammlungen (ab 700 Ind.):*

| | | |
|---|---|---|
| 04.04.2011 | 720 Ind. | Radegast-Brackede, Bleckede (G. BARDOWICKS) |
| 20.01.2012 | 800 Ind. | Alt Garge, Große Marsch, Bleckede (H. MÜLLER-SCHERZ) |
| 11.02.2012 | 1.000 Ind. | Wilkenstorf-Laake. Amt Neuhaus (C. PIELSTICKER) |
| 23.02.2012 | 950 Ind. | Radegast-Brackede, Bleckede (J. PRÜTER) |
| 03.03.2012 | 1.300 Ind. | Brackede, Vorland, Bleckede (J. PRÜTER) |
| 10.03.2012 | 3.400 Ind. | Brackede, Goldufer, Bleckede (J. PRÜTER) |
| 10.03.2012 | 1.800 Ind. | Brackede, Goldufer, Bleckede (H. G. DÜLLBERG) |
| 12.03.2012 | 1.480 Ind. | Radegast-Brackede, Bleckede (G. BARDOWICKS) |
| 24.12.2012 | 910 Ind. | Brackede, Binnenfeld, Bleckede (J. WÜBBENHORST) |
| 06.01.2013 | 950 Ind. | Radegast-Brackede, Bleckede (F. STÜHMER) |
| 07.01.2013 | 760 Ind. | Brackede, Goldufer, Bleckede (J. WÜBBENHORST) |
| 18.02.2013 | 890 Ind. | Neu Bleckede, Bleckede (A. DEGEN) |
| 03.03.2013 | 750 Ind. | Wilkenstorfer Teiche, Amt Neuhaus (H. EGGERS) |
| 30.03.2013 | 840 Ind. | Privelack, Amt Neuhaus (K. ZORNIG) |
| 01.04.2013 | 1.000 Ind. | Neu Bleckede, Bleckede (J. PRÜTER) |
| 02.04.2013 | 1.540 Ind. | Heisterbusch, Bleckede (J. WÜBBENHORST) |
| 02.04.2013 | 1.639 Ind. | Neu Bleckede, Bleckede (A. DEGEN) |
| 24.02.2015 | 1.100 Ind. | Wilkenstorf-Laake, Amt Neuhaus (W. HABICHT) |

| | | |
|---|---|---|
| 23.03.2015 | 700 Ind. | Wilkenstorfer, Amt Neuhaus (W. HABICHT) |
| 06.03.2016 | 900 Ind. | Brackede, Vorland, Bleckede (F. STÜMER, K. HEITLAND) |
| 19.03.2016 | 800 Ind. | Habekost, Garlstorf (M. SCHNEIDER) |
| 23.03.2016 | 1.000 Ind. | Brackeder Stau, Bleckede (H. RAHLFS) |

HGD

**(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)**

**Weißwangengans *Branta leucopsis***

| | | |
|---|---|---|
| rG 151-400 | Datensätze 269 / 38<br>Datenlage gut | RL: Nds R ; D * |

Die Gesamtzahl der in Niedersachsen überwinternden Weißwangengänse hat seit 1970 kontinuierlich zugenommen (NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM 2006). Im Landkreis Lüneburg stieg von 1990 bis 2000 sowohl die Anzahl der Beobachtungen als auch der beobachteten Individuen pro Jahr (KORSCH 2004) hochsignifikant ($p<0,05$). Dieser Trend wird im Landkreis Lüneburg in den letzten Jahren nur in abgeschwächter Form fortgesetzt (Abb. 15), während er im Hamburger Raum ungebrochen stark ist (J. HARTMANN et al. 2007).
Die Weißwangengans ist wie Saat- und Blässgans hauptsächlich im Amt Neuhaus anzutreffen, die vom Fluss weiter entfernten Gebiete nordöstlich der B195 nutzt sie dabei kaum (J. WÜBBENHORST unveröff.).




**Abb. 15:** Weißwangengans: a) Anzahl der Beobachtungen im Landkreis Lüneburg 1990 bis 2007; Trend hochsignifikant ($p<0,05$), Zunahme. b) Anzahl der beobachteten Individuen 1990 bis 2007; Trend nicht signifikant, Zunahme. c) durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

*Nahrungsflächen:*
Während die Weißwangengänse in der niedersächsischen Küstenregion das feuchte Grünland der seenahen Marschen und die Salzwiesen des Wattenmeeres als Nahrungsflächen bevorzugen

(NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM 2006), ist es im Berichtsgebiet das Grünland, welches im Frühjahr und Herbst Dreiviertel der Nahrungsfläche stellte (Tab. 10).

**Tab. 10:** Weißwangengans: Die gemeldeten Rasthabitate (n= 102) von 2001 bis 2007, aufgeteilt in Frühjahr und Herbst.

| Habitat | Frühjahr | | Herbst | |
|---|---|---|---|---|
| Grünland | 44 | 76 % | 33 | 75 % |
| Grüneinsaat | 2 | 3 % | 2 | 5 % |
| Ölsaat | 2 | 3 % | 5 | 11 % |
| Getreide | 1 | 2 % | 2 | 5 % |
| Wintergetreide | 4 | 7 % | 0 | 0 % |
| Stoppelacker | 1 | 2 % | 1 | 2 % |
| Abgeerntetes Maisfeld | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
| Überschwemmte Wiesen | 3 | 5 % | 0 | 0 % |
| Altarm | 1 | 2 % | 0 | 0 % |
| Summe | 58 | 100% | 44 | 100 % |

**Tab. 11:** Weißwangengans: Die Truppgrößen der Berichtszeiträume 1990 bis 2000 und 2001 bis 2007 im Vergleich, ohne Sommerbeobachtungen und Beobachtungen von zahmen Individuen.

| Truppgröße | Häufigkeit | | | | Summe der Individuen pro Klasse | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1990 - 2000 | | 2001 - 2007 | | 1990 - 2000 | | 2001 - 2007 | |
| Individuen | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| 1 - 9 | 112 | 68 % | 178 | 71 % | 112 | 7 % | 563 | 17 % |
| 10 - 19 | 27 | 16 % | 39 | 16 % | 391 | 25 % | 529 | 16 % |
| 20 - 49 | 21 | 13 % | 17 | 7 % | 562 | 36 % | 534 | 17 % |
| 50 - 99 | 3 | 2 % | 11 | 4 % | 198 | 13 % | 731 | 23 % |
| 100 - 360 | 2 | 1 % | 4 | 2 % | 280 | 18 % | 866 | 27 % |
| Summe | 165 | 100 % | 249 | 100 % | 1.543 | 99 % | 3.223 | 100 % |

*Größere Ansammlungen:*

| | | |
|---|---|---|
| 19.02.2007 | 300 Ind. | Neu Bleckede, N bis Sude WZ-TG 3 (K. KOERTH) |
| 17.12.2007 | 260 Ind. | Habekost, Elbvorland (J. WÜBBENHORST) |
| 30.12.2007 | 360 Ind. | Sude bei Mahnkenwerder (ST. HOLLERBACH, M. KORSCH, H. MULSOW) |

*Vergesellschaftungen:*

Von den 269 gemeldeten Beobachtungen von 2001 bis 2007 haben 40 Angaben zur Vergesellschaftung (15 %), wobei davon auszugehen ist, dass nicht alle Melder Vergesellschaftungen angeben. Bis zu 19 Individuen waren zu 46 % mit Trupps aus Saat- und Blässgänsen und zu 24 % mit Trupps aus Saat-, Bläss- und Graugänsen vergesellschaftet. Zusätzliche Arten waren Kurzschnabel- und Rothalsgans (U. RICK, K.-W. KIRSCH) sowie Sing- und Höckerschwan.

*Sommerbeobachtungen:*

Im Sommer 2004 wurden 1 bis 2 Individuen regelmäßig an der Elbe zwischen Sassendorf und Bleckede beobachtet (G. BARDOWICKS, V. DIERSCHKE, H. DÜLLBERG).

MK