Spießente *Anas acuta*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Spießente *Anas acuta*

Status: rG 151-400 Ind.	Datensätze: n.b. Datenlage: n.b.	Status Nds: I Bestand Nds: 1 BP RL Nds: 1	Status D: $I^{B}\,I^{W}$ Bestand D: ss^{B} 30-40 BP mh^{W} RL D: $3^{B}\,V^{W}$

Foto 1: 13.02.2016, Spießerpel, Bleckede, Heisterbusch, Mathias Schneider

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Spießente *Anas acuta*

rG 151-400	Datensätze 322 / 46 Datenlage gut	RL: Nds 1; D 3



Abb. 30: Spießente: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend nicht signifikant, gleich bleibend. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Rastbestände im Berichtsgebiet überwiegend an der Elbe und im Amt Neuhaus. Bis zu 10 Ind. in der Lüneburger Marsch (V. DIERSCHKE) und bis zu 5 auf dem Rethmoorsee (W. GEITEL). Während der Wasservogelzählung im März 2002 wurden in der Lüneburger Elbtalaue 1.843 Ind. gezählt. Diese extrem hohe Zahl wirkt sich auf die Werte für 2001/2002 bz. für den Monat März in Abb. 30 aus.

Größere Ansammlungen an der Elbe und im Amt Neuhaus:

08.03.2001	200 Ind.	Preten (F. BINDRICH)
24.03.2002	1.200 Ind.	Radegaster Haken (H. DÜLLBERG)
25.03.2005	300 Ind.	Heisterbuschwiesen (H. DÜLLBERG)

MK