Schellente *Bucephala clangula*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 1-7 BP rG 21-50 Ind.	Datensätze: 1.139/127 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 30 P RL Nds: *	Status D: $I^B I^W$ Bestand D: s^B 3.300-4.000 P mh^W RL D: $*^B *^W$

Foto 1: 08.11.2014, Schellente, Erpel, NSG Fehlingsbleck, Mathias Schneider

Bereits seit der Jahrtausendwende besteht ein regelmäßiges Brutvorkommen am Lopausee bei Amelinghausen. Der See dient außerdem als Rast- und Überwinterungsquartier. Im Frühjahr konnten bis zu 5 Paare beobachtet werden, von denen einige spät noch abzogen. Am Ostufer des Sees wurden Nistkästen ausgebracht, die von den Schellenten angenommen und zur Brut genutzt werden. Der einzige Brutnachweis abseits des Lopausee gelang 2010, als ein Paar in einem Schleiereulenkasten in Neuhaus-Carrenzien brütete (P. BURMEISTER).

Brutgeschehen am Lopausee 2008-2016:

2008 Brutverdacht, im Juni bis zu 8 weibchenfarbene Individuen
2009 Brutverdacht, im Juni 3 weibchenfarbene Individuen
2010 Brutverdacht, im Juni 6 weibchenfarbene Individuen
2011 Eine erfolgreiche Brut mit 4 Jungvögeln
2012 Zwei erfolgreiche Bruten mit 2 bzw. 3 Jungvögeln
2013 Brutverdacht, im Juni 6 weibchenfarbene Individuen
2014 Eine erfolgreiche Brut mit 4 Jungvögeln, ein weiteres Paar brutverdächtig
2015 Zwei erfolgreiche Bruten mit jeweils 4 Jungvögeln
2016 Eine erfolgreiche Brut mit 3 Jungvögeln

Brutzeitfeststellungen:

Bodenentnahme Schleusenow (2009, 2010, 2013)
Bodenentnahme Gülstorf (2008, 2014)
Wilkenstorfer Teiche (2015, 2016)

Sudeniederung (2015)
Habekost (2016)

Rastbestände (Ansammlungen >30 Ind.):
04.03.2013 32 Bodenentnahme Schleusenow (A. DEGEN)
22.02.2016 37 Wilkenstorfer Teiche (E. STEFFEN)
11.03.2016 33 Wilkenstorfer Teiche (W. HABICHT)

HR

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Schellente *Bucephala clangula*

rB 1-7 rG 21-50	Datensätze 350 / 50 Datenlage mittel	RL: Nds * ; D *



Abb. 35: Schellente: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend nicht signifikant, gleich bleibend. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Rastbestände im Berichtsgebiet überwiegend an der Elbe und im Amt Neuhaus. Bis zu 11 Ind. NSG Fehlingsbleck (U. RICK), bis zu 5 auf dem Rethmoorsee (W. GEITEL) und je bis zu 6 auf dem Kreideberg- (W. GEITEL) und Lopausee (C. HORN).

Größere Ansammlungen an der Elbe und im Amt Neuhaus:

15.03.2002	44 Ind.	Brackede-Vierwerder, Elbvorland (G. BARDOWICKS)
19.10.2002	24 Ind.	Wilkenstorfer Teiche, Mittelteich (WASSERVOGELZÄHLUNG ALLMER)
11.11.2007	24 Ind.	Wilkenstorfer Teiche, gesamt (WASSERVOGELZÄHLUNG ALLMER)

Sommerbeobachtungen diesjähriger Vögel:
Bis auf die Jahre 2004 und 2007 wurden jedes Jahr ab Mitte Mai bis zu 5 immat. auf dem Lopausee beobachtet (C. HORN).

MK