Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rG 21-50 Ind.	Datensätze: 166/18 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 120 P RL Nds: 1	Status D: I^B I^W Bestand D: ss^B 900-1.100 P s^W RL D: 1^B 2^W

Foto 1: 20.06.2010, Trauerseeschwalbe, Bodenentnahme Schleusenow, Jörg Chmill



Abb. 1: Trauerseeschwalbe. Links: Summe der Beobachtungen (n=163) und der beobachteten Individuen (n=957). Rechts: durchschnittliche Monatssummen der Beobachtungen (n=18) und der Individuen (n=106) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Heimzug - erste Feststellungen:

03.05.2008	7 Ind. ad.	Radegaster Haken Nord (S. MUNZINGER, H. MÜLLER-SCHERZ)
28.04.2009	2 Ind.	Bodenentnahme Schleusenow (J. WÜBBENHORST)
20.04.2011	4 Ind.	Bodenentnahme Schleusenow (J. WÜBBENHORST)
01.05.2012	1 Ind.	Habekost (J. PRÜTER)

17.04.2013	1 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (F. ALLMER, C. HORN, B. MIELKE)
20.04.2014	1 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (W. GOLNIK)
10.05.2015	2 Ind.	Bodenabbau Gülstorf (H. G. DÜLLBERG)
16.04.2016	1 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (H. G. DÜLLBERG)

Wegzug - letzte Feststellungen:

20.08.2008	1 Ind.	Sassendorf/Hohnstorf (G. BARDOWICKS)
08.09.2009	1 Ind.	Stiepelse, Elbvorland (U. RICK, K.-W. KIRSCH)
15.09.2010	2 Ind., juv.	Heisterbuschwiesen (J. WÜBBENHORST)
19.09.2011	1 Ind., SK	Habekost (G. BARDOWICKS)
18.08.2012	4 Ind.	Radegaster Haken Süd (H. G. DÜLLBERG)
19.10.2013	1 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (C. HORN, B. MIELKE)
14.08.2014	1 Ind., juv.	Habekost (M. SCHNEIDER)
02.09.2015	1 Ind.	Habekost (M. SCHNEIDER)
13.08.2016	1 Ind.	Radegaster Haken Süd (M. SCHNEIDER)

Größere Ansammlungen ab 15 Ind.:

17.08.2008	20 Ind.	Radegaster Haken Süd (J. WÜBBENHORST, K.-W. KIRSCH)
17.05.2014	18 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (H. G. DÜLLBERG)
09.07.2014	35 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (M. KANDOLF)
12.07.2014	39 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (F. ALLMER, C. HORN, B. MIELKE)
10.05.2015	28 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (H. G. DÜLLBERG)
14.05.2015	35 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (U. HINZE)
15.05.2015	37 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (H. G. DÜLLBERG)
07.07.2015	45 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (V. BLÜML)
09.07.2015	36 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (H. G. DÜLLBERG)
15.07.2015	25 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (E. STEFFEN)

Sonstige Beobachtungsgebiete innerhalb und außerhalb der Elbtalaue:
Wehninger Haken und Werder, Raffatzer Teiche, Bodenentnahme Haar, Heisterbuschwiesen, Sudewiesen und Rögnitz, Bodenabbau Gülstorf, Großer See bei Stapel, Brandstader Haken, Elbvorland bei Strachau, Brackeder Stau, Striepelsee bei Hohnstorf und Hafen Bleckede.

Brut:
Die letzte Brut linkselbisch fand 1974 auf dem Brackeder Stau statt (ALLMER 1984). Rechtselbisch zogen in den 1990er Jahren am Wehninger Haken regelmäßig 3-5 Brutpaare ihre Jungen groß (KORSCH 2004).
Nach dem Jahr 2000 wurden an verschiedenen Gewässern Brutflöße ausgebracht (Wehninger Haken, Altwasser im Vordeichgelände bei Laake, Wilkensdorfer Teiche), doch es kam bisher nicht mehr zu Bruten im Landkreis Lüneburg. Diese Gewässer werden zur Brutzeit regelmäßig von adulten Trauerseeschwalben aufgesucht, die im Nachbarlandkreis Lüchow-Dannenberg (Penkefitzer See bis 2010 oder Taube Elbe bei Penkefitz ab 2011), links der Elbe, brüten (J. WÜBBENHORST, 2014). Ab Anfang Juli können dort auch bereits flügge Jungvögel beobachtet werden.

HGD

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

rG 8-20	Datensätze 55 / 8 Datenlage gut	RL: Nds 2 ; D 1

Heimzug - erste Beobachtungen:

26.04.2003	3 Ind. PK	Habekost NSG, rastend (V. DIERSCHKE)
02.05.2006	1 Ind.	Elbvorland Brackede-Vierwerder (G. BARDOWICKS)
02.05.2006	5 Ind.	Brackeder Stau, Hochwasser (G. BARDOWICKS)

Wegzug - letzte Beobachtungen:

17.09.2007	1 JK/SK	Habekost NSG (G. BARDOWICKS)
12.10.2007	1 JK/SK	Habekost NSG, stoßtauchend (H. DÜLLBERG)





Abb. 112: Trauerseeschwalbe. Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Größere Ansammlungen ab 10 Ind.:

12.05.2002	12 Ind.	Wehninger Haken, an und auf Nistflößen (F. ALLMER)
09.05.2006	11 Ind.	Elbvorland Brackede, elbaufwärts fliegend (H. DÜLLBERG)
17.07.2007	23 Ind.	Wilkenstorfer Teiche, im Bereich der Baggerteiche war reger Flugbetrieb mit flüggen juv. zu beobachten (ca. 20 bis 25 Ind.) (W. GOLNIK)

Beobachtung außerhalb der Elbtalaue:

29.6.2006: 1 Ind., Lopausee, jagend (C. HORN)

Brut:

Die letzte Brut linkselbisch fand 1974 auf dem Brackeder Stau statt (ALLMER 1984). Rechtselbisch zogen in den 1990er Jahren am Wehninger Haken regelmäßig 3-5 Brutpaare ihre Jungen groß (KORSCH 2004).

Nach dem Jahr 2000 wurden an verschiedenen Gewässern Brutflöße ausgebracht (Wehninger Haken, Altwasser im Vordeichgelände bei Laake, Wilkensdorfer Teiche), doch es kam bisher nicht mehr zu Bruten im Landkreis Lüneburg. Diese drei Gewäser werden zur Brutzeit regelmäßig von Trauerseeschwalben aufgesucht, die im Nachbarlandkreis Lüchow-Dannenberg, links der Elbe, brüten. (F. ALLMER).

Am Wehninger Haken wurde regelmäßig reger Angelbetrieb zur Ankunftszeit der Trauerseeschwalben beobachtet. (F. ALLMER, C. HORN)

CH